Complément au webinaire sur la vaccination contre les VPH du 16 septembre 2016

Réponses aux questions des participantes posées dans le module conversation et qui, par manque de temps, n'ont pu être répondues pendant le webinaire

1. Est-ce que le vaccin est gratuit pour les femmes ayant des relations sexuelles avec d'autres femmes plus de 18ans?

   ***Réponse* :** *Non. Voir PIQ chapitre 4 (p.104) et chapitre 10.4.4 (p. 344-345)*

2. La réponse immunitaire chez les 26-45 ans est-elle plus faible que chez les 14-15 ans?

   Réponse : *Oui, voir PIQ page 348.*

3. Pouvez-vous parler des études en cours au Québec sur le VPH, les infirmières scolaires reçoivent des questions des parents à ce sujet?

   Réponse *: L'INSPQ mène plusieurs études dans le contexte du plan d'évaluation provincial. D'autres organisations, incluant les fabricants de vaccins, mènent aussi des études. L'étude ICI-VPH menée par l'INSPQ conjointement avec les Centres de recherche du CHU de Québec et du CHUM recrute des filles en secondaire 3 dans plusieurs régions jusqu'en décembre 2016. La lettre envoyée aux parents des filles en secondaire 3 est jointe à la page 2 du présent document.*

4. Chez les HARSAH âgés de plus de 26 ans est-ce que la vaccination est conseillé et efficace lorsqu'ils le désirent?

   Réponse *: Pour les hommes le vaccin n'est homologué que jusqu'à l'âge de 26 ans. Il n'y a pas de données d'efficacité chez les plus âgés.*

5. Pour la vaccination en 4e année, les élèves de 4e année de 8 ans sont-ils exclus?

   Réponse *: Oui, il faut attendre jusqu'à l'âge de 9 ans pour débuter la vaccination. Cette information est ajoutée au PIQ à la mise à jour de septembre 2016.*

6. Qu'est-ce que nous disons aux parents qui voudraient faire vacciner leur garçon de sec. 3

   Réponse : *C'est possible, mais ce sera à leurs frais. Le vaccin est cependant recommandé et offert gratuitement si immunosuppression ou s'il a ou prévoit avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes.*

7. Un jeune ayant eu sa primo-vaccination contre VPH-4 peut-il recevoir un complément ou un rappel avec le Gardasil 9?

   Réponse : *Oui, mais ce sera à ses frais. Voir le Q/R du MSSS, septembre 2016*
   http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001243/

8. Pour la contamination peau à peau, est-ce qu'il peut y avoir transmission même sans la présence de condylomes?

   Réponse : Oui, les infections aux VPH sont souvent asymptomatiques.

9. À partir de quel âge le Pap test est-il recommandé?

   Réponse : À partir de l'âge de 21 ans. Il peut être retardé chez les femmes qui n'ont pas encore eu de relations sexuelles à cet âge. (source : https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/915_AvisOptDepCancerCol.pdf)

Préparé par Chantal Sauvageau, Gisèle Trudeau, Vladimir Gilca, Monique Landry, 22 septembre 2016

ICI-VPH

Institut national de santé publique Québec

Étude visant à évaluer l'impact des calendriers d'immunisation contre les VPH

Québec, le 5 août 2016

MME X

Cher parent,

Nous sollicitons la participation de votre fille MAGGY à l'évaluation du programme de vaccination contre les virus du papillome humain (VPH) déjà en place au Québec.

Nous invitons toutes les jeunes filles de la région qui étaient en âge d'être en 4e année du primaire en 2011. Nous avons obtenu vos coordonnées par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), après qu'elle ait reçu l'autorisation de la Commission d'accès à l'information du Québec (CAI). Seules les filles ayant reçu le vaccin contre les VPH en 4e année du primaire peuvent participer à ce projet.

But et déroulement de l'étude

La participation de votre fille aidera à mieux comprendre la protection offerte par le vaccin et la différence entre le fait de recevoir 2 ou 3 doses du vaccin.

Si vous acceptez que votre fille participe à l'étude, vous et votre fille devrez vous rendre une seule fois au Centre de recherche (situé dans le secteur de Beauport) pour une rencontre qui peut avoir lieu en dehors des heures de classe. Votre fille répondra à un court questionnaire sur sa santé et devra faire elle-même un prélèvement vaginal avec un coton-tige (Q-tips). L'infirmière de recherche lui enseignera comment procéder. La moitié des jeunes filles recevra une 3e dose de vaccin et l'autre moitié n'en recevra pas (déterminé au hasard).

Une compensation financière vous sera offerte ainsi qu'à votre fille. Par la suite, les participantes effectueront elles-mêmes un prélèvement vaginal avec un coton-tige qu'elles recevront par la poste tous les 6 mois et rempliront un questionnaire en ligne une fois par année, et ce, pendant 5 ans. La participation de votre fille est totalement volontaire, mais très importante à l'évaluation du programme de vaccination.

Vous souhaitez en savoir plus sur cette étude? Vous et votre fille désirez y participer?

Nous vous invitons à communiquer avec nous au numéro suivant: (418) 666-7000 poste 388 ou par courriel : recherche_vaccination@ssss.gouv.qc.ca. Indiquez votre nom, votre numéro de téléphone et le meilleur moment pour vous rejoindre. Un membre de notre équipe de recherche vous contactera sous peu.

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. Je vous prie d'agréer, cher parent, mes salutations distinguées.

Chantal Sauvageau, md
Chercheure principale pour la region de Québec

P.-S. This letter is also available in English. You may obtain a copy by contacting us at (418) 666-7000 ext 388.