

En 2015-2016 pour l'ensemble du Québec, plus de la moitié des fumeurs (53,7%) ont commencé à fumer entre 15 et 19 ans et près du tiers d'entre eux (28,7%) ont débuté après l'âge de 20 ans. On remarque également que l'âge d'initiation au tabagisme se situe entre 15 et 19 ans, et ce, pour tous les groupes d'âge. Par contre, la proportion de fumeurs âgés entre 18-24 ans qui ont débuté entre 15-19 ans (74,5%) est significativement plus élevée que celle des 25-44 ans, des 45-64 ans et des 65 ans et plus (respectivement 50,4%, 54,7% et 43,3%). Finalement, davantage de fumeurs de 65 ans et plus ont commencé à fumer après l'âge de 20 ans (39,8%) que ceux de 45-64 ans (28,8%).

Faits saillants

Répartition des fumeurs réguliers selon l'âge d'initiation au tabagisme quotidien pour l'ensemble du Québec et par groupe d'âge, 12 ans et plus, ESCC 2015-2016

	Âge d'initiation	Proportion brute (%)	Borne inférieure de l'I.C. à 99 %	Borne supérieure de l'I.C. à 99 %
Ensemble du Québec	Entre 5 et 11 ans	1,7	1,1	2,4
	Entre 12 et 14 ans	15,9	13,7	18,5
	Entre 15 et 19 ans	53,7	50,3	57,1
	20 ans et plus	28,7	25,6	32,0
Groupe d'âge				
12-17 ans	Entre 5 et 11 ans	n.p **	0,0	19,5
	Entre 12 et 14 ans	n.p **	5,7	57,3
	Entre 15 et 19 ans	76,9	41,9	93,9
	20 ans et plus	n.p **	.	.
18-24 ans	Entre 5 et 11 ans	n.p **	0,6	5,6
	Entre 12 et 14 ans	14,6 *	8,6	23,8
	Entre 15 et 19 ans	74,5	62,4	83,7
	20 ans et plus	n.p **	3,7	20,3
25-44 ans	Entre 5 et 11 ans	n.p **	0,7	2,6
	Entre 12 et 14 ans	17,9	13,6	23,0
	Entre 15 et 19 ans	50,4	44,7	56,2
	20 ans et plus	30,4	24,9	36,4
45-64 ans	Entre 5 et 11 ans	1,9 *	1,0	3,4
	Entre 12 et 14 ans	14,7	11,6	18,4
	Entre 15 et 19 ans	54,7	49,3	59,9
	20 ans et plus	28,8	24,1	34,0

65 ans et +	Entre 5 et 11 ans	n,p **	0,9	4,1
	Entre 12 et 14 ans	15,0 *	9,9	22,1
	Entre 15 et 19 ans	43,3	35,1	51,9
	20 ans et plus	39,8	32,2	48,0

Notes

Les fumeurs réguliers correspondent aux fumeurs qui fument au moins une cigarette par jour.

· I.C. : Intervalle de confiance.

* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** : Coefficient de variation supérieur à 25 %. Donnée non présentée (n,p.)

· Les données des régions Nord-du-Québec, Nunavik et Terres-Cries-de-la-Baie-James ne sont pas incluses.

Source(s) de données :

- Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), Statistique Canada.

Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, le 3 octobre 2019 à 15:20.

Mise à jour de l'indicateur le 18 juin 2019.

Faits saillants

En 2015-2016, on retrouve statistiquement moins de fumeurs chez les 12-17 ans comparativement à tous les autres groupes d'âge. On note une situation similaire chez les 65 ans et plus qui affichent une proportion plus faible de fumeurs que celle des autres groupes d'âge.

Proportion de fumeurs pour l'ensemble du Québec, 12 ans et plus, ESCC 2015-2016

Groupe d'âge	Proportion brute (%)	Borne inférieure de l'I.C. à 99 %	Borne supérieure de l'I.C. à 99 %
12-17 ans	5,0 *	3,4	7,3
18-24 ans	20,5	17,1	24,5
25-44 ans	23,0	21,0	25,1
45-64 ans	20,7	19,1	22,4
65 ans et +	10,5	9,2	12,0
Total	18,3	17,4	19,3

Notes

Les fumeurs comprennent les « fumeurs réguliers » qui fument au moins une cigarette par jour tous les jours et les « fumeurs occasionnels » qui, eux, ne fument pas la cigarette tous les jours.

- I.C. : Intervalle de confiance.
- * : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.
- Les données des régions Nord-du-Québec, Nunavik et Terres-Cries-de-la-Baie-James ne sont pas incluses.

Source(s) de données :

- Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), Statistique Canada.

Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, le 3 octobre 2019 à 15:12.
Mise à jour de l'indicateur le 18 juin 2019.

En 2016-2017, la proportion des jeunes du secondaire âgés de 12 ans et plus ayant fumé une première cigarette au complet avant d'avoir 12 ans s'estime à 1,0%. Ce sont respectivement 2,5% des élèves de 13 ans et plus qui ont fumé une cigarette complète avant d'avoir 13 ans, 6% des 14 ans et plus qui l'ont fait avant d'avoir 14 ans, 10% des 15 ans et plus avant d'avoir 15 ans, 16% des 16 ans et plus avant d'avoir 16 ans et, enfin, 22% des 17 ans et plus avant d'avoir 17 ans.

Âge d'initiation à la première cigarette au complet, élèves du secondaire. Québec, EQSJS, 2016-2017

	Proportion brute (%)	Borne inférieure de l'I.C. à 99 %	Borne supérieure de l'I.C. à 99 %
Proportion des élèves du secondaire de 12 ans et plus ayant fumé une première cigarette avant l'âge de 12 ans (ensemble des élèves de 12 ans et plus)	1,0	0,9	1,2
Proportion des élèves du secondaire de 13 ans et plus ayant fumé une première cigarette avant l'âge de 13 ans (ensemble des élèves de 13 ans et plus)	2,5	2,3	2,8
Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant fumé une première cigarette avant l'âge de 14 ans (ensemble des élèves de 14 ans et plus)	5,6	5,2	6,1
Proportion des élèves du secondaire de 15 ans et plus ayant fumé une première cigarette avant l'âge de 15 ans (ensemble des élèves de 15 ans et plus)	10,3	9,5	11,1
Proportion des élèves du secondaire de 16 ans et plus ayant fumé une première cigarette avant l'âge de 16 ans (ensemble des élèves de 16 ans et plus)	15,6	14,4	16,9
Proportion des élèves du secondaire de 17 ans et plus ayant fumé une première cigarette avant l'âge de 17 ans (ensemble des élèves de 17 ans et plus)	21,9	20,0	24,0

Notes

- I.C. : Intervalle de confiance.
- Les résultats présentés sont basés sur le questionnaire 1 et le questionnaire 2 puisque les questions utilisées pour produire la requête sont communes aux deux questionnaires.

Source(s) de données :

- Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017, Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec.

Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, le 3 octobre 2019 à 14:21.

En 2016-2017, environ 5% des élèves du secondaire sont des fumeurs de cigarettes. Plus précisément, 3,1% se retrouvent dans la catégorie des «fumeurs actuels», qui correspond à la combinaison des "fumeurs quotidiens"(1,6%) et des "fumeurs occasionnels" (1,5%), et 2,4% dans celle des «fumeurs débutants». En ce qui concerne le niveau scolaire, la proportion de fumeurs de cigarettes est moins élevée en 1re secondaire (0,5% de fumeurs quotidiens et 0,4% de fumeurs occasionnels) qu'en 5e (2,0% de fumeurs quotidiens et 2,9% de fumeurs occasionnels). La hausse de la proportion de fumeurs avec le niveau scolaire est également observée chez les fumeurs débutants.

Faits saillants

Répartition des élèves du secondaire selon le statut de fumeur chez l'ensemble des élèves et selon le niveau scolaire. Québec, EQSJS, 2016-2017

	Fumeurs quotidiens			Fumeurs occasionnels			Fumeurs débutants			Non-fumeurs		
	Proportion brute (%)	Borne inférieure de l'I.C. à 99 %	Borne supérieure de l'I.C. à 99 %	Proportion brute (%)	Borne inférieure de l'I.C. à 99 %	Borne supérieure de l'I.C. à 99 %	Proportion brute (%)	Borne inférieure de l'I.C. à 99 %	Borne supérieure de l'I.C. à 99 %	Proportion brute (%)	Borne inférieure de l'I.C. à 99 %	Borne supérieure de l'I.C. à 99 %
Ensemble des élèves	1,6	1,4	1,8	1,5	1,3	1,7	2,4	2,2	2,6	94,6	94,1	95,0
Niveau scolaire												
1re secondaire	0,5*	0,3	0,9	0,4*	0,2	0,6	0,8*	0,5	1,2	98,3	97,7	98,8
2e secondaire	1,2	0,9	1,7	0,6	0,4	0,8	1,4	1,1	1,8	96,8	96,1	97,3
3e secondaire	2,1	1,6	2,7	1,6	1,2	2,1	2,7	2,3	3,3	93,6	92,5	94,5
4e secondaire	2,3	1,8	3,0	2,3	1,7	2,9	2,9	2,4	3,6	92,5	91,3	93,6
5e secondaire	2,0	1,5	2,5	2,9	2,3	3,5	4,4	3,7	5,3	90,7	89,4	91,9

Notes

- I.C. : Intervalle de confiance.
- * : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.
- Les résultats présentés sont basés sur le questionnaire 1 et le questionnaire 2 puisque les questions utilisées pour produire la requête sont communes aux deux questionnaires.
- Les élèves non-fumeurs regroupent les catégories « Anciens fumeurs », « Anciens expérimentateurs » et « Non-fumeurs depuis toujours ».

Source(s) de données :

- Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017, Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec.

Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, le 3 octobre 2019 à 16:17.

Faits saillants

En 2016-2017, la proportion des élèves du secondaire qui ont fumé la cigarette électronique au moins une fois au cours de leur vie est d'environ 29%. La proportion de jeunes ayant essayé la cigarette électronique augmente avec le niveau scolaire, passant de 12% en 1re secondaire à 43% en 5.

Proportion des élèves du secondaire ayant déjà utilisé une cigarette électronique chez l'ensemble des élèves et selon le niveau scolaire. Québec, EQSJS, 2016-2017

	Proportion brute (%)	Borne inférieure de l'I.C. à 99 %	Borne supérieure de l'I.C. à 99 %
Ensemble des élèves	29,1	28,3	29,9
Niveau de scolarité			
1re secondaire	11,5	10,3	12,9
2e secondaire	22,3	20,6	24,0
3e secondaire	32,3	30,4	34,2
4e secondaire	39,7	37,5	42,0
5e secondaire	43,3	41,2	45,4

Notes

- I.C. : Intervalle de confiance.
- Les résultats présentés sont basés sur le questionnaire 1 et le questionnaire 2 puisque les questions utilisées pour produire la requête sont communes aux deux questionnaires.

Source(s) de données :

- Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017, Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec.

Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, le 3 octobre 2019 à 15:04.
Mise à jour de l'indicateur le 4 avril 2019.

En 2016-2017, la proportion des élèves ayant utilisé la cigarette électronique au cours des 30 derniers jours est d'environ 11%. La proportion d'utilisateurs de la cigarette électronique au cours des 30 derniers jours augmente avec le niveau scolaire. En effet, les élèves de la 1re secondaire (5%) sont significativement moins nombreux que ceux de la 2e secondaire (9%) en avoir fait usage au cours des 30 derniers jours tandis que ceux des 3e, 4e et 5e secondaire (13%, 14% et 15% respectivement) sont significativement plus nombreux que ceux de la 1re et de la 2e secondaire.

Faits saillants

Proportion des élèves du secondaire ayant utilisé une cigarette électronique au cours des 30 derniers jours pour l'ensemble du Québec et selon le niveau scolaire, EQSJS 2016-2017

	Proportion brute (%)	Borne inférieure de l'I.C. à 99 %	Borne supérieure de l'I.C. à 99 %
Ensemble des élèves	10,9	10,3	11,4
Niveau de scolarité			
1re secondaire	4,9	4,1	5,8
2e secondaire	8,9	7,9	10,1
3e secondaire	12,9	11,6	14,3
4e secondaire	13,9	12,5	15,4
5e secondaire	14,7	13,3	16,2

Notes

C.V. : Coefficient de variation.

· Les résultats présentés sont basés sur le questionnaire 1 et le questionnaire 2 puisque les questions utilisées pour produire la requête sont communes aux deux questionnaires.

Source(s) de données :

- Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017, Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec.

Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, le 7 octobre 2019 à 8:53.

Mise à jour de l'indicateur le 4 avril 2019.