

FAITS SAILLANTS

Messages clés

1. Symptômes = Protégez les autres, portez le masque (approche syndromique, continuité des messages)
2. Vulnérables = Protégez-vous, portez le masque
3. Tous = Diminuez / ralentissez la transmission, portez le masque dans les lieux publics ([3Cs](#))

Responsabiliser les milieux :

- Encourager le port du masque (affichage), en mettre à disposition lorsque possible, permettre le lavage des mains,
- Soyez exemplaires (permettre le télétravail lorsque possible, diminuer les occasions de socialisation non-essentiels, ...)

Clientèles vulnérables

- Personnes âgées
- Personnes immunosupprimées
- Tous petits (ajout!) – Faisons-le pour eux :
 - 0-5 ans plus à risque, car population « naïve » en raison de la pandémie;
 - < 30 jours : restez à la maison, évitez les activités et interactions sociales non-essentiels.

RECOMMANDATIONS - MESURES SANITAIRES

Objectifs de la rencontre (3)

1. Définir la recommandation préliminaire sur la position pour le port du masque dans les lieux publics :
 - ✓ Population visée
 - ✓ Lieux ou activités ciblées
 - ✓ Moment (quand – Début, mais aussi fin)
2. Définir tout autre message complémentaire si requis,
3. Identifier les partenaires à mobiliser:
 - ✓ DGILEA pour la disponibilité des EPI,
 - ✓ MEQ/MES/MFA
 - ✓ MEI, MAPAQ (commerces et services)
 - ✓ Ordres professionnels, associations et autres relayeurs d'information...

Mise en contexte

- Effet cumulatif des maladies respiratoires en circulation – Voir présentation INESS avec comparatif 2015-2019
- Observation des juridictions voisines (perspective anticipatoire)
- Situation préoccupante dans les milieux de soins – Voir présentation INESS – compression de l'accès aux soins médicaux (ajout de la COVID + 0-5 ans plus élevé que par le passé, car population « naïve » en raison de la pandémie)
- Positions de diverses parties prenantes (médiatisées)
- Dans un contexte de complémentarité avec l'approche syndromique proposée il y a quelques semaines.

RECOMMANDATIONS - MESURES SANITAIRES

Clientèle ou milieu	Port du masque	Autres recommandations
Personnes vulnérables	<i>En tout temps, lors d’interactions sociales ou dans les lieux publics</i>	Bébés <30 jours : restez à la maison, évitez les activités et interactions sociales non-essentielles. Enfants moins 6 mois : Éviter d’exposer à trop de contacts 6 à 24 mois : vaccination influenza recommandée, à encourager ?? Femmes enceintes : Vaccination
Milieus préscolaires	Non	Messages particuliers à leurs parents : Soyez prudents + vaccination offerte
Milieus scolaires (primaire, secondaire)	Sx = port du masque (approche syndromique)	
Milieus d’enseignement supérieur et éducation aux adultes	Sx = port du masque (approche syndromique) Lieu public = port du masque (3Cs)	
Milieus de vie (RPA, CHSLD) pour les résidents et leurs visiteurs (aires communes)	Sx = port du masque (approche syndromique) Lieu public = port du masque (3Cs)	

RECOMMANDATIONS - MESURES SANITAIRES

Commerces et services	Lieu public = port du masque (3Cs) Peut être retiré au moment de recevoir un service (lorsque ce dernier l'exige)	Mettre à disposition de leur clientèle une solution hydroalcoolique ou la possibilité de se laver les mains
Restaurants et bars	Lieu public = port du masque (3Cs) Peut être retiré une fois à table	
Milieus de travail	Lieu public = port du masque (3Cs)	Télétravail lorsque possible (exemplarité de l'état et responsabilisation des employeurs)
Transport collectif	Lieu public = port du masque (3Cs)	