

Corridors RUIS pour l'envoi des analyses suprarégionales				
Provenance ▼	1^{er} choix	2^{ème} choix	3^{ème} choix	4^{ème} choix
Un établissement du RUIS de l'Université McGill	RUIS de l'université McGill (HGJ, CUSM)	RUIS de l'Université de Montréal (HMR, CHUM, CHU Ste-Justine)	RUIS de l'Université de Sherbrooke (CHUS)	RUIS de l'Université Laval (CHU de Québec)
Un établissement du RUIS de l'Université de Montréal	RUIS de l'Université de Montréal (HMR, CHUM, CHU Ste-Justine)	RUIS de l'Université McGill (HGJ, CUSM)	RUIS de l'Université Laval (CHU de Québec)	RUIS de l'Université de Sherbrooke (CHUS)
Un établissement du RUIS de l'Université Laval	RUIS de l'Université Laval (CHU de Québec)	RUIS de l'Université de Sherbrooke (CHUS)	RUIS de l'Université de Montréal (HMR, CHUM, CHU Ste-Justine)	RUIS de l'Université McGill (HGJ, CUSM)
Un établissement du RUIS de l'Université de Sherbrooke	RUIS de l'Université de Sherbrooke (CHUS)	RUIS de l'Université Laval (CHU de Québec)	RUIS de l'Université McGill (HGJ, CUSM)	RUIS de l'Université de Montréal (HMR, CHUM, CHU Ste-Justine)

NOTE : * Si un test est effectué à 2 endroits dans le RUIS U de Mtl (soit HMR et CHUM): Les régions 01, 02, 03,04, 09,10, 12,14, 15, 16 envoient au CHUM et les régions 05,06, 07, 08, 11et 13, 17 et 18 envoient à HMR. Si en plus il y a le CHU Ste-Justine comme centre producteur: Tous les prélèvements pédiatriques vont à CHU Ste-Justine.