

## Séquence de prise en charge des patients susceptibles d'être atteints par la Covid-19

1- Préparation du véhicule sur les lieux de l'intervention		
<b>1- Matériel dans l'habitacle</b>	Prévoir un équipement de rechange pour chacun des deux paramédics comprenant les items suivants : une paire de lunette et/ou visière, un masque N-95, une blouse anti-éclaboussure, 2 paires de gants à poignets longs. Prévoir également un sac biohazard et une bouteille de solution antiseptique. Idéalement faire cette étape en début de quart.	
<b>2- Fermer la cloison entre l'habitacle et la cabine de soins</b>		
<b>3- Mettre en marche la ventilation à pression négative de la cabine de soins</b>		
<b>4- Positionner la bouteille de solution antiseptique dans la porte du passager du véhicule ou sur le plancher devant le siège passager</b>	La bouteille de solution antiseptique doit être accessible et utilisable sans toucher aux composantes de l'habitacle.	
<b>5- Positionner le sac biohazard à l'arrière du véhicule</b>	Ne pas mettre le sac dans la trajectoire de sortie de la civière. Le positionnement du sac à ce moment évitera de contaminer inutilement les armoires de la cabine de soins, l'habitacle et minimisera la contamination des portes extérieures du véhicule.	
<b>6- Préparer le matériel d'évacuation</b>	Cette étape minimise la contamination des équipements et des rangements du véhicule.	
<b>Attacher vos cheveux, retirer casquette et tuque</b>		
		



## Séquence de prise en charge des patients susceptibles d'être atteints par la Covid-19

2- Séquence d'habillage sur les lieux de l'intervention		
<b>1- Mettre une première paire de gants à poignets longs</b>	Étendre les poignets au maximum. Mettre par-dessus les manches d'une chemise à manches longues.	
<b>2- Mettre la blouse anti-éclaboussure</b>	Enfiler par devant. Nouer le cordon du haut derrière le cou. Demander au partenaire de fermer le mieux possible la blouse à l'arrière. Nouer le cordon à la taille. Vérifier que tous les cordons sont à l'extérieur de la blouse.	
<b>3- Mettre une deuxième paire de gants à poignets longs</b>	Étendre les poignets au maximum. Mettre par-dessus les manches de la blouse anti-éclaboussures.	
<b>4- Mettre le masque N-95</b>	Vérifier que le masque correspond au modèle testé pour le paramédic. Ouvrir et appliquer le masque sur le visage et positionner les élastiques en commençant par celui du bas. Vérifier l'étanchéité du masque.	
<b>5- Mettre les lunettes de protection</b>	Les lunettes de vue ne sont pas sécuritaires, mettre des lunettes de protection	
<b>6- Mettre la visière</b>	La visière peut remplacer les lunettes ou être utilisée en complément avec ces dernières. Valider le niveau de protection requis dans les bulletins cliniques. Appliquer la visière au milieu du front et ajuster la courroie.	



## Séquence de prise en charge des patients susceptibles d'être atteints par la Covid-19

3- Séquence de déshabillage sur les lieux de l'intervention		
<b>1- Préparer le sac biohazard</b>	Replier les rebords pour qu'ils demeurent ouverts.	
<b>2- Retrait de la deuxième paire de gants</b>	L'extérieur des gants ne doit pas toucher leurs intérieurs ni la première paire de gants.	
<b>3- Retrait de la visière et/ou des lunettes</b>	Minimiser le contact de vos mains avec ces pièces d'équipement (ex. deux doigts). Retirer les en les éloignant de votre visage. Attention de ne pas toucher votre visage et votre masque.	
<b>4- Retrait de la blouse anti-éclaboussure</b>	Détacher ou rupturer les cordons, retirer la blouse en vous inclinant vers l'avant. Agripper à l'avant et retirer en déroulant les manches et en enroulant la blouse sur elle-même.	
<b>5- Fermeture du sac biohazard</b>	Utiliser la technique du cou de cygne. Attention de toujours garder l'extrémité du sac éloigné de votre visage. Après avoir fait le cou de cygne, noué le sac, pas avant.	
<b>6- Retrait d'un gant de la première paire de gants</b>	Attention de ne pas contaminer la main dégantée.	
<b>7- Prendre le gant retiré, les lunettes réutilisables et le sac biohazard avec la main encore gantée</b>	Attention de ne pas contaminer la main dégantée.	
<b>8- Ouverture de la porte latérale de la cabine de soins</b>	Ouvrir la porte avec la main dégantée.	
<b>9- Déposer le gant retiré, les lunettes réutilisables et le sac biohazard dans la cabine de soins</b>	Assurez-vous de ne pas insérer la main dégantée dans la cabine de soins. Attention de ne pas toucher aux composantes de la cabine de soins avec la main gantée et insérer votre bras au minimum requis pour accomplir la tâche.	
<b>10- Retrait du dernier gant et le déposer dans la cabine de soins</b>	Utilise la dernière main dégantée pour déposer le gant souillé dans le véhicule. Insérer le bras au minimum dans la cabine de soins.	
<b>11- Fermeture de la porte latérale de la cabine de soins</b>	Si vous avez touché la poignée extérieure avec un gant contaminé, refermer la porte en la manipulant par l'extérieur sans toucher à cette poignée.	
<b>12- Lavage des mains</b>	Laver vos mains pendant 30 secondes en ne négligeant aucun endroit. Ne pas oublier les poignets. Utiliser les techniques reconnues.	



## Séquence de prise en charge des patients susceptibles d'être atteints par la Covid-19

4- Séquence de déshabillage au centre hospitalier		
<b>1- Utiliser l'aire dédiée par le centre hospitalier et leur poubelle biohazard</b>	Il faut se dévêtir dans l'aire dédiée et utiliser les poubelles biohazards du centre hospitalier. Tous les déchets biohazards doivent être laissés aux endroits prévus dans les centres hospitaliers. Ceci inclut les équipements de protection retirés sur les lieux de l'intervention.	
<b>2- Retrait de la deuxième paire de gants</b>	L'extérieur des gants ne doit pas toucher leurs intérieurs ni la première paire de gants. Déposer dans la poubelle biohazard du centre hospitalier.	
<b>3- Retrait de la visière et/ou des lunettes de protection</b>	Minimiser le contact de vos mains avec ces pièces d'équipement (ex. deux doigts). Retirez-les en les éloignant de votre visage. Attention de ne pas toucher votre visage et votre masque. Déposer dans la poubelle biohazard du centre hospitalier.	
<b>4- Retrait de la blouse anti-éclaboussure</b>	Détacher ou rupturer les cordons, retirer la blouse en vous inclinant vers l'avant. Agripper à l'avant et retirer en déroulant les manches et en enroulant la blouse sur elle-même. Déposer dans la poubelle biohazard du centre hospitalier. Ne pas jeter les lunettes réutilisables. Il faut les décontaminer.	
<b>5- Retrait de la première paire de gants.</b>	L'extérieur des gants ne doit pas toucher leurs intérieurs votre peau ou votre uniforme. Déposer dans la poubelle biohazard du centre hospitalier.	
<b>6- Lavage des mains</b>	Laver vos mains pendant 30 secondes en ne négligeant aucun endroit. Ne pas oublier les poignets. Utiliser les techniques reconnues.	
<b>7- Retrait du masque N-95</b>	Inclinez-vous vers l'avant, en passant par derrière votre tête, retirer d'abord l'élastique du bas, ensuite celui du haut. Ne toucher ni à votre visage ni au masque.	
<b>8- Lavage des mains</b>	Laver vos mains pendant 30 secondes en ne négligeant aucun endroit. Ne pas oublier les poignets. Utiliser les techniques reconnues.	

